

Accupro 10 **Comprimate filmate a 10 mg**

Va rugam sa cititi acest prospect cu atentie inainte de a incepe tratamentul cu Accupro 10. Prospectul contine informatii importante despre tratament. Daca nu intelegeti sau doriti sa stiti mai mult, intrebati medicul dumneavoastra sau farmacistul.

Numele medicamentului este *Accupro' 10*. INGREDIENTUL ACTIV este clorhidratul de quinapril.

CE CONTINE ACEST MEDICAMENT?

Fiecare comprimat filmat, de forma triunghiulara, contine quinapril 10 mg sub forma de clorhidrat de quinapril 10,832 mg si excipienti: *nucleu* - carbonat de magneziu greu, gelatina, lactoza, crospovidona, stearat de magneziu; *film* - Opadry alb OY-S-7331 (hidroxipropilmetilceluloza, hidroxipropilceluloza, dioxid de titan, Macrogol 400, ceara Candelila).

Accupro 10 este ambalat in cutii cu 3 blistere a cate 10 comprimate filmate.

Detinatorul autorizatiei de punere pe piata este: Pfizer H.C.P.

Corporation, 235 East 42nd Street, New York, NY 10017-5755, SUA.

Accupro 10 este fabricat de: Godecke GmbH, Mooswaldallee, 1, D-79090 Freiburg, Germania.

CE FEL DE MEDICAMENT ESTE ACCUPRO 10?

Acest medicament face parte din grupa medicamentelor care inhiba enzima de conversie a angiotensinei. Inhibitorii enzimei de conversie a angiotensinei actioneaza prin largirea vaselor de sange din corp, ceea ce micsoreaza presiunea sangelui din vase.

PENTRU CE ESTE INDICAT ACCUPRO 10?

Accupro 10 este un inhibitor al enzimei de conversie a angio-tensinei, folosit pentru tratarea hipertensiunii arteriale si a insuficientei cardiace congestive.

INAINTE DE A LUA ACCUPRO 10?

Daca raspunsul la oricare din intrebarile de mai jos este DA, trebuie sa intrebati medicul inainte de a lua *Accupro 10*, deoarece, in aceste situatii, este posibil ca *Accupro 10* sa nu va poata fi administrat: - Ati avut vreodata reactii alergice la *Accupro 10*, la oricare din componentii acestui medicament sau la medicamente asemanatoare?

Sunteti insarcinata, intentionati sa deveniti insarcinata sau alaptati?

Efectuati sau trebuie sa efectuati o cura de desensibilizare, si anume pentru a reduce reactiile la intepaturile de albine sau de viespi?

Sunteti tratat sau pe cale de fi tratat prin afereza lipoproteinelor cu densitate mica (inlaturarea colesterolului din sange prin anumite aparate)?

Sunteti tratat prin dializa (prin folosirea de "rinichi artificial")? Suferiti de boli vasculare de collagen (depunerea de collagen in vasele de sange)?

Suferiti de boli de rinichi?

Sunteti planificat pentru operatii, inclusiv la stomatolog?

Daca va aflati in tratament cu *Accupro 10*, trebuie sa informati medicul, deoarece cel mai probabil veti fi anesteziat, ceea ce este important pentru starea tensiunii arteriale.

Ati avut de curand diaree, varsaturi, transpiratii exagerate sau ati suferit de alte afectiuni cu pierderi importante de lichide din corp? De asemenea, medicul va va sfatui sa continuati sa beti lichide in cantitati normale in timpul tratamentului cu *Accupro*

Luati alte medicamente care contin tetraciclina, litiu, suplimente de potasiu (inlocuitori pentru sarea de bucatarie, cucontinut in potasiu), diuretice (medicamente care stimuleaza urinarea) sau alte medicamente impotriva hipertensiunii arteriale (de exemplu, propranolol), a altor boli de inima (de exemplu, digoxina) sau cimetidina (pentru ulcerul gastric)?

Pentru price alte medicamente pe care le luati in timpul sau inainte de a incepe tratamentul cu *Accupro*

10, intrebati medicul.

CUM TREBUIE LUAT ACCUPRO 10?

Accupro 10 se ia o data sau de doua ori pe zi. Vetii incepe cu o doza mica, dupa care, daca este necesar, doctorul va recomanda cresterea acesteia, pana se ajunge la doza eficace.

Se recomanda administrarea comprimatelor la aceleasi ore ale zilei, indiferent de mese.

Hipertensiune arteriala

Doza initiala este, de obicei, de 10 mg, putand fi apoi crescuta la 20-40 mg pe zi. De obicei, doza nu va fi crescuta mai repede de o luna. Daca este necesar, medicul poate prescrie pana la maximum 80 mg pe zi.

Daca deja va aflati in tratament cu un diuretic, medicul poate recomanda o doza initiala de 5 mg quinapril, care poate fi apoi crescuta treptat.

Insuficienta cardiaca conqestiva

Accupro 10 se administreaza in acelasi timp cu un diuretic, iar doza initiala este de 5 mg quinapril, care poate fi apoi crescuta la 10-40 mg quinapril pe zi, luate o data sau impartite in doua prize.

Urmati cu strictete indicatiile medicului si nu schimbati niciodata dozele din proprie initiativa.

Boli de rinichi

Daca suferiti de boli de rinichi, medicul poate sa va recomande doze mai mici.

Nu este necesara modificarea dozelor.

Copii

Accupro 10 nu este indicat copiilor.

CE SE INTAMPLA DACA UITATI SA LUATI UN COMPRIMAT?

Nu fiti ingrijorat. Daca ati uitat sa luati un comprimat, luati-l imediat ce va amintiti, cu conditia sa nu fie ora programata pentru urmatoarea doza; nu luati niciodata doua doze o data.

CE SE INTAMPLA DACA LUATI PEA MULTE COMPRIMATE O DATA?

Prea multe comprimate luate o data pot fi periculoase. Daca ati luat prea multe comprimate o data, anuntati medicul imediat sau adresati-va celei mai apropiate unitati medicale. Luati cu dumneavoastra comprimatele ramase si/sau ambalajul, pentru' ca personalul medical sa stie ce medicament ati luat.

ACEST MEDICAMENT POATE CAUZA EFECTE NEDORITE?

Ca si alte medicamente, Accupro 10 poate uneori determina efecte nedorite. De obicei, acestea sunt usoare si trecatoare.

In cazul tratamentului cu Accupro 10, singur sau impreuna cu medicamente diuretice, aceste efecte pot fi:

Observate la mai mult de unul din 100 pacienti: dureri de cap, ameteli, tuse seaca, oboseala, greata si/sau varsaturi, dureri musculare, diaree, dureri de piept, dureri abdominale, tulburari digestive, dureri de spate, respiratie dificila, stranut; secretii nazale abundente, dureri in gat, insomnie, hipotensiune arteriala (scaderea presiunii sangelui), parestezii (amorteli, furnicaturi).

Alte efecte nedorite observate la mai putin de unul din 100 pacienti au fost: reactii anafilactice (umflarea fetei, limbii si a faringelui, cu dificultati in respiratie), tulburari de vedere, uscaciunea gurii, acumulare de gaze in intestine, pancreatita (inflamarea pancreasului), scaderea numarului de trombocite din sange (cu formarea dificila a cheagurilor de sange), depresie, nervozitate, somnolenta, caderea exagerata a parului, vanatai sau inrosirea pielii, transpiratii excesive, mahcarime, infectii urinare, impotenta sexuala, dureri ale articulatiilor, umflarea membrelor sau umflarea generalizata a corpului (edem generalizat), anemie (scaderea numarului de celule rosii din sange) sau neutropenie/agranulocitoza (scaderea numarului de celule albe din sange, ceea ce duce la infectii frecvente), cresterea nivelului de

potasiu din sange, cresterea creatininei si a azotului uremie (substante care arata starea functionarii rinichilor).

Adresati-va imediat medicului daca prezentati unul din aceste efecte nedorite sau daca apar alte efecte nedorite decat cele mentionate mai sus.

PUTETI CONDUCE VEHICULE SAU FOLOSI UTILAJE IN TIMPUL TRATAMENTULUI CU ACCUPRO ?

Daca aveti ameteli, trebuie sa evitati conducerea vehiculelor sau folosirea de utilaje. Acestea pot apare mai ales la inceputul tratamentului.

CUM SE PASTREAZA ACCUPRO ?

A se pastra la temperaturi intre 15-30°C, in ambalajul original.

A nu se lasa la indemana copiilor.

A nu se folosi dupa data expirarii marcata pe ambalaj.

AVETIGRIJA DE MEDICAMENT

Acest tratament este pentru dumneavoastra. Doar medicul va poate recomanda tratamentul cu *Accupro 10*. Nu dati niciodata medicamentul altor persoane, deoarece le poate dauna, chiar daca prezinta manifestari asemanatoare cu ale dumneavoastra.

INFORMATII SUPUMENTARE

Acest prospect nu contine toate informatiile despre medicament.

Daca aveti intrebari sau nu sunteti siguri de ceva, consultati medicul sau farmacistul.

Data ultimei verificari a prospectului Noiembrie 2002