

## ACCUPRO 20

### Comprimate filmate a 20 mg

Va rugam sa cititi cu atentie acest prospect inainte de a incepe administrarea medicamentului  
Pastrati acest prospect, deoarece s-ar putea sa doriti sa-l recititi.  
Daca aveti nelamuriri sau doriti informatii suplimentare, intrebati medicul sau farmacistul.  
Acest medicament v-a fost prescris dumneavoastra personal si nu trebuie sa-l dati altor persoane, chiar daca sufera de aceleasi simptome, deoarece le-ar putea crea neplaceri.

#### **Acest prospect va ofera urmatoarele informatii:**

- 1. Ce este Accupro 20 si pentru ce este indicat**
- 2. Inainte de a utiliza Accupro 20**
- 3. Cum se administreaza Accupro 20**
- 4. Reactii,adverse posibile**
- 5. Cum se pastreaza Accupro 20**

*Accupro 20, comprimate filmate 20 mg*

Quinapril (sub forma de clorhidrat de quinapril)

Substanta activa este clorhidratul de quinapril. Un comprimat filmat contine quinapril 20 mg sub forma de clorhidrat de quinapril 21,664 mg.

Excipienti! sunt: *nucleu* - carbonat de magneziu greu, gelatina, lactoza, crospovidona, stearat de magneziu; *film* - Opadry\* White OY-S-7331 [hidroxipropilmetilceluloza, hidroxipropilceluloza, dioxid de titan (E171), Macrogol 400; ceara Candelilla).

#### **Detinatorul autorizatiei de punere pe piata:**

Pfizer Europe MA EEIG, Ramsgate Road, Sandwich, Kent CT13-9NJ, Marea Britanie

Accupro 20 este produs de Godecke GmbH, Germania.

#### **1. CE ESTE ACCUPRO 20 SI PENTRU CE ESTE INDICAT**

Componentul activ, quinaprilul, face parte din grupa de medicamente denumite inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei (IEC). IEC dilata vasele de sange, prin aceasta ducand la scaderea tensiunii arteriale.

Comprimatele sunt de forma rotunda, biconvexa, marcate cu linie mediana pe ambele fete si specificatia „20” pe una dintre fete. Comprimatele sunt ambalate in cutii cu blistere, continand 30 comprimate.

*Accupro 20* este folosit pentru tratarea hipertensiunii arteriale si adjuvant in tratamentul insuficientei cardiace congestive.

#### **2. INAINTE DE A UTILIZA ACCUPRO 20**

##### **Nu utilizati Accupro 20 daca:**

sunteti alergic la quinapril sau substante inrudite (alti IEC), sau la excipienti! produsului;

sunteti gravida sau doriti sa ramaneti gravida;

efectuati sau trebuie sa efectuati o cura de desensibilizare, si anume pentru a reduce reactiile la intepaturile de albine sau de viespi;

ati suferit un transplant de rinichi;

suferiti de stenoza aortica sau mitrala care afecteaza in mod deosebit activitatea inimii;

suferiti de hiperaldosteronism primar (boala in care urina este eliminata in cantitate mare, se pierde excesiv potasiu din organism, tensiunea arteriala, este crescuta)

#### **Atentionari speciale in cazul tratamentului cu Accupro 20:**

##### **Informati medicul daca:**

- sunteti tratat sau pe cale de a fi tratat prin afereza lipoproteinelor' cu densitate mica (inlaturarea colesterolului din sange prin anumite aparate);
- suferiti de colagenoze (exces de depunere a colagenului in vasele de sange);
- suferiti de boli de ficat sau de rinichi;

- sunteti planificat pentru operatii, inclusiv la stomatolog. Daca va aflati in tratament cu *Accupro 20*, trebuie sa informati medicul, deoarece cel mai probabil veti fi anesteziat, ceea ce este important pentru tensiunea arteriala;
- ati avut de curand diaree, varsaturi, transpiratii exagerate sau ati suferit de alte afectiuni cu pierderi importante de lichide din corp; medicul va va sfatui sa beti lichide in cantitati adecvate in timpul tratamentului cu *Accupro 20*.

#### **Administrarea medicamentului impreuna cu alimente sau cu bauturi:**

*Accupro 20* poate fi administrat indiferent de orarul meselor.

#### **Sarcina:**

*Accupro- 2Q* nu trebuie administrat in timpul sarcinii. Daca ramaneti gravida in timpul tratamentului cu *Accupro 20*, informati medicul imediat. Cereti sfatul medicului dumneavoastra<sup>1</sup> sau farmacistului inainte de a lua orice medicament in timpul sarcinii.

#### **Alaptare:**

*Accupro 20* nu trebuie administrat in timpul perioadei de alaptare, decat daca este strict indicat de catre medic. Cereti sfatul medicului dumneavoastra sau farmacistului inainte de a lua orice medicament in timpul alaptarii.

#### **Capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje:**

Nu conduceti vehicule si nu folositi utilaje daca aveti ameteli. Acesta reactie adversa poate sa apara mai ales la inceputul tratamentului cu *Accupro20*.

#### **Informatii importante despre unii componentii ai medicamentului:**

Comprimatele contin stearat de magneziu. Acesta poate incetini absorbtia unor medicamente, cum sunt tetraciclina (un antibiotic).

#### **Folosirea altor medicamente:**

Unele medicamente. catunci cand sunt administrate in acelasi timp cu *Accupro 20*, pot influenta modul in care *Accupro 20* actioneaza, sau *Accupro 20* poate influenta modul in care aceste medicamente actioneaza., Spuneti medicului daca sunteti in tratament cu oricare dintre medicamentele urmatoare:

- tetraciclina
- litiu
- medicamente cu adaos de potasiu (inlocuitori pentru sarea de bucatarie, cu continut in potasiu)
- diuretice (medicamente care stimuleaza urinarea), mai ales spironolactona, triamteren sau amilorid
- alte medicamente pentru tratamentul hipertensiunii arteriale
- medicamente antidiabetice (insulina sau antidiabetice, orale)

Informati medicul sau farmacistul daca utilizati sau ati utilizat recent orice alt medicament, chiar si dintre cele care se elibereaza fara prescriptie medicala.

### **3. CUM SE ADMINISTREAZA ACCUPRO 20**

Utilizati intotdeauna *Accupro 20* cu respectarea stricta a indicatiilor medicului. Daca aveti nelamuriri, cereti sfatul medicului sau farmacistului.

Daca aveti impresia ca *Accupro 20* actioneaza prea slab sau prea puternic, informati medicul sau farmacistul,

Comprimatele pot fi administrate o data sau de doua ori pe zi.

Tratamentul incepe cu o doza mica; care poate fi marita, daca medicul considera necesar, pana ce se obtine efectul terapeutic dorit.

Se recomanda administrarea comprimatelor la aceleasi ore din zi, in mod regulat. Comprimatele se inghit cu o cantitate suficienta de apa.

## **Hipertensiune arteriala**

De obicei, doza initiala este de 10 mg quinapril, putand fi apoi crescuta la 20-40 mg quinapril pe zi. De obicei, doza nu va fi crescuta mai repede de o luna. Daca este necesar, medicul poate prescrie pana la maximum 80 mg quinapril pe zi.

Daca deja va aflati in tratament cu un diuretic, medicul poate recomanda o doza initiala de 20 mg quinapril, care poate fi apoi crescuta treptat.

## **Insuficienta cardiaca conaestiva**

*Accupro 20* se administreaza in acelasi timp cu un diuretic sau/si un glicozid cardiac, iar doza initiala este de 20 mg quinapril, administrata o data sau de doua ori pe zi. Aceasta doza poate fi apoi crescuta la 10-40 mg quinapril pe zi, administrata o data sau impartita in doua prize.

Urmati cu strictete indicatiile, medicului si nu schimbati niciodata dozele din proprie initiativa!

## **Boli de rinichi**

Daca suferiti de boli de rinichi medicul poate sa va recomande doze mai mici. Nu este necesara modificarea dozelor.

## **Copii**

*Accupro 20* nu este indicat copiilor.

## **Daca utilizati prea multe comprimate odata:**

Daca utilizati prea multe comprimate poate fi periculos; tensiunea arteriala putand sa scada prea mult. Anuntati medicul sau adresati-va imediat celui mai apropiat spital.

## **Daca uitati sa administrati o doza:**

Nu va ingrijorati. Administrati urmatorul comprimat imediat ce va amintiti; daca este momentul urmatoarei doze, administrati doar aceasta doza; nu luati o doza dubla pentru a recupera doza uitata.

## **4. REACTII ADVERSE POSIBILE**

Ca si in cazul altor medicamente, *Accupro 20* poate produce reactii adverse. De obicei, acestea sunt usoare si trecatoare. In cazul tratamentului cu *Accupro 20* singur sau impreuna cu medicamente diuretice, aceste reactii pot fi:

Observate la mai mult de unul din 100 pacienti: dureri de cap, ameteli, tuse seaca, oboseala, greata si/sau varsaturi, dureri musculare, diaree, dureri de piept, dureri abdominale, tulburari de digestie, dureri de spate, respiratie dificila, stranut, secretii nazale abundente, dureri in gat, insomnie, hipotensiune arteriala (scaderea tensiunii arteriale), parestezie (amorteli, furnicaturi); cresterea in sange a creatininei si a azotului ureic.

Alte reactii adverse, observate la mai putine de unul din 100 pacienti, au fost: anemie, scaderea numarului de trombocite din sange (cu formarea dificila a cheagurilor de sange), reactii alergice (umflarea fetei, limbii sau gatului, cu tulburari de respiratie), depresie, nervozitate/somnolenta, tulburari de vedere, angina pectorala, palpitatii, cresterea frecventei batailor cardiace, ameteala si slabiciune la ridicarea din pozitia sezand sau culcat, lesin, dilatarea vaselor de sange, uscaciunea gurii sau gatului, acumulare de gaze in intestine, pancreatita (inflamarea/pancreasului), caderea masiva a parului, inrosirea pielii sau eroziuni ale pielii, transpiratii profuze, sensibilitate crescuta a pielii la lumina solara, senzatie de mancarime, dureri articulare, infectii urinare, impotenta sexuala; umflarea membrelor sau umflarea generalizata a corpului (sdem generalizat).

Reactii adverse rare: umflarea fetei, limbii, gatului, sau a "mucoasei intestinale, neutropenie/agranulocitopenia (scaderea numarului de celule albe din sange, ceea ce duce la infectii frecvente), cresterea nivelului de potasiu din sange.

Daca observati aparitia unei alte reactii, adverse decat cele mentionate, va rugam, de asemenea, sa informati medicul sau farmacistul.

## **5. CUM SE PASTREAZA ACCUPRO 20**

A nu se utiliza dupa data de expirare inscrisa pe ambalaj. A se pastra la temperaturi sub 25°C, in ambalajul original.

A nu se lasa la indemana copiilor.

## **Data ultimei verificari a prospectului**

Decembrie, 2005