

## **ACICLOVIR 200 mg Comprimate**

## **ACICLOVIR 400 mg Comprimate**

Va rugam cititi cu atentie acest prospect deoarece contine informatii importante despre medicamentul dumneavoastra. Daca aveti nelamuriri, intrebati medicul sau farmacistul.

### **Ce contine acest medicament?**

ACICLOVIR 200 mg, comprimate. Un comprimat contine aciclovir 200 mg si excipienti: polividona, celuloza microcristalina, amidon glicolat de sodiu, lactoza, stearat de magneziu.

ACICLOVIR 400 mg, comprimate. Un comprimat contine aciclovir 400 mg si excipienti: polividona, celuloza microcristalina, amidon glicolat de sodiu, stearat de magneziu, siliciu coloidal anhidru.

### **Pentru ce este acest medicament?**

Aciclovir, substanta activa din Aciclovir comprimate, apartine unui grup de medicamente numit antivirale. Medicul prescrie aceste comprimate pentru tratamentul manifestarilor muco-cutanate produse de infectiile cu virusul Herpes Simplex (VHS) inclusiv herpesul genital. Acest medicament este util si in tratamentul herpesului zoster.

NU UITATI: Acest medicament a fost prescris NUMAI pentru dvs. Nu il dati si altcuiva chiar daca prezinta aceleasi simptome. Poate sa-i dauneze.

### **Cand nu trebuie sa folositi Aciclovir .**

Nu trebuie sa folositi aceste comprimate daca:

- ati avut o reactie alergica in timpul tratamentului cu preparate care contin aciclovir
- stiti ca sunteti alergic la unul din componentii acestor comprimate.

### **Precautii inaintea folosirii comprimatelor**

Inainte de inceperea tratamentului cu Aciclovir asigurati-va ca ati spus medicului daca sunteti insarcinata, intentionati sa ramaneti insarcinata sau alaptati.

Daca suferiti de boli renale cu scaderea functiei renale, spuneti medicului. Aceste conditii impun reducerea dozelor (a se vedea pct. - Cum sa luati aceste tablete). Cum sa procedati daca deja primiti alte tratamente (a se vedea pct. - Cum pot alte medicamente influenta tratamentul cu Aciclovir)

### **Precautii in timpul tratamentului cu comprimate Aciclovir**

Doctorul poate recomanda efectuarea anumitor teste de laborator in timpul tratamentului. Aceste teste pot evidentia anumite modificari ale valorilor bilirubinei, ureei sanguine, creatininei si elementelor sangelui.

### **Cum pot alte medicamente influenta tratamentul cu Aciclovir**

Inaintea inceperii tratamentului cu Aciclovir comprimate, asigurati-va ca i-ati spus medicului despre orice alt medicament pe care deja il luati sau pe care urmeaza sa-l luati. Unele medicamente trebuie administrate cu prudenta in cazul asocierii cu Aciclovir comprimate, cum sunt acelea care afecteaza functia renala. Daca luati Probenecid (un medicament uricozuric, utilizat in tratamentul gutei), asigurati-va ca i-ati spus medicului inainte de a incepe tratamentul cu Aciclovir.

### **Capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje in timpul tratamentului cu Aciclovir**

Daca nu apar efecte adverse grave, tratamentul cu Aciclovir nu afecteaza activitatile zilnice cum ar fi conducerea vehiculelor si folosirea utilajelor.

### **Cum sa luati aceste comprimate**

Doctorul va va spune cate comprimate sa luati si cat de des. Asigufaii-,va ca ati luat comprimatele conform recomandarii lui.

Numarul comprimatelor pe care le luati o data se numeste doza. Aciclovir comprimate pot fi

inghitite, sau luate dupa ce le zdrobiti si le dizolvati in putina apa.

Pentru orice infectie tratamentul este mai eficient daca este inceput cat mai devreme posibil. Durerea, senzatiile de furnicaturi sau de intepaturi precum si roseata la nivelul pielii zonei afectate sunt semnele precoce ale bolii si trebuie sa indice inceperea tratamentului.

### **Adulti**

Tratamentul infectiilor cu VHS. Medicul poate sa va spuna sa incepeti tratamentul cu o doza zilnica de 1 g (5 x 200 mg). Luati comprimatele in timpul zilei, la 4 ore timp de 5 zile. Daca aveti o infectie grava, doctorul poate, sa prelungeasca tratamentul cu inca 5 zile. Asigurati-va ca urmati cu exactitate instructiunile medicului. Tratamentul pacientilor cu imunitate scazuta sau ma/absorbție. Doctorul poate considera necesara marirea dozei la 2 g pe zi (5 x 400 mg). Tratamentul infectiilor recidivante cu VHS la pacienti cu sistemului imunitar normal. Medicul va va recomanda sa luati 2 x 200 mg sau 3 x 200 mg pe zi. Daca acestea nu sunt suficiente, va poate recomanda sa luati o doza zilnica - de 800 mg (in doze divizate la fiecare 6 ore). Daca sunteti tratat cu Aciclovir comprimate pentru o perioada, doctoral ; poate hotara intreruperea tratamentului pentru a reevalua terapia.

Tratamentul profilactic al infectiilor cu VHS la persoane cu Z sistem imunitar compromis. Doza zilnica recomandata este de 800 mg (200 mg la fiecare 6 ore). Cazurile grave sau cele de malabsorbție pot necesita doze mai mari cum ar fi 1600 mg pe zi (400 mg la fiecare 6 ore). Tratamentul herpesului loster. Doctorul va va spune sa luati o doza de 4 g (5 x 800 mg, in doze divizate la 4 ore). Tratamentul trebuie urmarit cel putin 7 zile. Tratamentul cu aciclovir este mai eficient cand se incepe in primele 24 ore-de la prima manifestare cutanata a bolii.

### **Copii**

Tratamentul infectiilor cu HSV si profilaxia la copii cu sistem imunitar anormal. Copiii sub 2 ani pot primi jumătate din doza pentru adulti, 500 mg (5 x 100 mg); copiii peste 2 ani pot primi doza de adult de 1 g. Pacienti cu tulburari ale functiei renale. Dozele pentru acesti pacienti depind de testele sanguine. Doctorul va poate spune cate comprimate sa luati si cat de des. Asigurati-va ca urmati instructiunile lui. Daca luati comprimatele la ore stabilite, va puteti aminti cu usurinta sa le luati.

Daca ati uitat o doza, luati-o imediat ce va amintiti si continuati tratamentul.

Daca dvs. sau altcineva, ati luat prea multe comprimate, sau credeti ca un copil a luat vreuna, adresati-va imediat la cel mai apropiat spital. Luati acest prospect si comprimatele ramase si aratati-le medicului.

### **Reactii adverse care pot sa apara**

De obicei tratamentul cu Aciclovir comprimate este bine tolerat. Cu toate acestea pot sa apara simptome noi. Puteti avea rash, gastralgii sau diaree. Aceste efecte pot sa nu fie grave si sa dispara odata cu incetarea tratamentului. Probleme ca tulburari ale somnului, ameteala, confuzie si/sau halucinatii pot sa apara in principal la pacientii cu tulburari ale functiilor renale. Testele de laborator pot sa arate modificarile unor valori sanguine, care totusi sunt numai temporare.

Daca unele din efectele mentionate mai sus se agraveaza, sau apar alte efecte nedorite care nu sunt mentionate tn acest prospect, trebuie sa informati medicul!

### **Pastrare**

A nu se utiliza dupa data de expirare inscrisa pe ambalaj. A se pastra la temperaturi sub 25°C, in ambalajul original. A nu se lasa la indemana copiilor.

### **Ambalaj**

ACICLOVIR 200 mg, comprimate: cutie cu 4 blistere a cate 5 comprimate

ACICLOVIR 400 mg, comprimate: cutie cu 2 blistere a cate 5 comprimate

### **Producator**

EGIS PHARMACEUTICALS LTD., UNGARIA

**Detinatorul Autorizatiei de punere pe piata**

EGIS PHARMACEUTICALS LTD.

1106 BUDAPESTA, Kereszturi ut 30-38.

UNGARIA

**Data ultimei verificari a prospectului**

Martie, 2004 |

EGIS Doc. No. 13220/R