

ACICLOVIR 5%

COMPOZITIA

Contine aciclovir 5 g, excipienti (alcool cetilstearyllic, laurilsulfat de sodiu, poloxamer, parafina lichida, propilenglicol, vaselina alba, apa purificata) in 100 g.

ACTIUNE FARMACOTERAPEUTICA

Agent antiviral fata de virusurile herpes simplex tip I si II si virusul varicello-zoster;
Impiedica replicarea virusurilor prin inhibarea ADN polimerazei specifice si consecutiv a sintezei de ADN viral.

INDICATII TERAPEUTICE

Crema *Aciclovir* este indicata pentru tratamentul infectiilor cu virus herpes simplex localizate la nivelul pielii, incluzand herpesul genital initial si recurent si herpesul labial.

CONTRAINDICATII

Hipersensibilitate la substanta activa sau propilenglicol.

PRECAUTII

Nu se recomanda aplicarea cremei *Aciclovir* pe mucoasa orala, vaginala sau conjunctivala.
Trebuie acordata o atentie deosebita pentru a evita introducerea accidentala in ochi.

MOD DE ADMINISTRARE

Se aplica pe leziuni de 6 ori/zi, la interval de aproximativ 3 ore, timp de 7 zile. Tratamentul trebuie inceput cat mai curand posibil dupa debutul infectiei, iar pentru episoadele recurente tratamentul trebuie sa inceapa de preferat in timpul perioadei sau cand apar primum leziuni.

REACTII ADVERSE

Dupa aplicarea cremei pot apare senzatii de arsura sau intepaturi trecatoare, eritem, prurit, uscarea si descumarea usoara a pielii .

PREZENTARE

Tuburi cu 5 g crema.

Tuburi cu 15 g crema.

PASTRARE

A nu se utiliza dupa data de expirare inscrisa pe ambalaj.

A se pastra in ambalajul original, la temperaturi intre 15 °C - 25 °C.

A nu se lasa la indemana copiilor.

PRODUCATOR

GEDEON RICHTER ROMANIA SA, Targu-Mures.

DETINATORUL AUTORIZATIEI DE PUNERE PE PIATA

GEDEON RICHTER ROMANIA SA, Targu-Mures, str. Cuza Voda nr. 99 - 105.

DATA ULTIMEI VERIFICARI A PROSPECTULUI:

martie 2004