

**Prospect**  
**Actovegin**  
**Drajeuri, 200 mg**

**Compozitie**

Un drajeu contine hemoderivat deproteinizat din sange de vitel 200 mg si excipienti:

- *nucleu* - celuloza microcristalina, povidona (K 90), stearat de magneziu, ta/c;
- *film gastrorezistent* - dieti/ftalat, ftalat de hipromeloza;
- *strat de drajefiere* - zahar, dioxid de titan (E171), galben de quinolina (E 104), povidona (K 30),
- macrogol 6000, guma arabica, talc, ceara montanglicol.

**Grupa farmacoterapeutica:** alte produse pentru tractul digestiv si metabolism; diverse.

**Indicatii terapeutice**

Tratamentul tulburarilor circulatorii si trofice cerebrale.

Continuarea tratamentului injectabil sau perfuzabil din tulburarile circulatorii si trofice cerebrale.

**Contraindicatii**

Hipersensibilitate la hemoderivat deproteinizat din sange de vitel sau la oricare dintre excipientii produsului.

**Precautii**

Daca exista contraindicatii sau apar reactii adverse, trebuie informat medicul.

De asemenea, trebuie informat medicul in cazul aparitiei sarcinii in timpul tratamentului cu *Actovegin*.

**Interactiuni**

Nu s-au observat pana in prezent.

**Atentionari speciale**

***Sarcina si alaptarea***

*In timpul sarcinii Actovegin va fi administrat numai la indicatiile medicului.*

*Actovegin poate fi administrat in timpul alaptarii.*

***Capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.***

*Actovegin nu influenteaza capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.*

**Doze si mod de administrare**       :

In absenta recomandarilor medicale, doza recomandata este de 1-2 drajeuri Actovegin (200-400 mg hemoderivat deproteinizat din sange de vitel), administrate oral, inaintea mesei, cu un pahar cu apa. Doza maxima recomandata este de 6 drajeuri *Actovegin* (1200 mg hemoderivat deproteinizat din sange de vitel). *Actovegin* poate fi administrat o perioada de 4-6 saptamani.

**Reactii adverse**

In rare cazuri, pacientii atopici pot dezvolta reactii alergice (de exemplu eruptii cutanate, senzatie de caldura, febra, soc).

Dozele mari pot determina tulburari gastrice.

**Supradozaj**

Nu sunt disponibile date.

**Pastrare**

A nu se utiliza dupa data de expirare inscrisa pe ambalaj. A se pastra la temperaturi sub 25 °C, in ambalajul original. A nu se lasa (a indemana copiilor).

**Ambalaj**

Cutie cu un flacon din sticla bruna a cate 30 drajeuri.

Cutie cu un flacon din sticla bruna a cate 50 drajeuri.

Cutie cu un flacon din sticla bruna a cate 100 drajeuri.

**Producator**

Nycomed Austria GmbH, Austria

**Detinatorul Autorizatiei de punere de piata**

Nycomed Austria GmbH

St. Peter Strasse 25, A-4020 Linz, Austria

**Data ultimei verificari a prospectului**

Septembrie 2004