

ADRENOSTAZIN

SOLUTIE INJECTABILA

Compozitie:

Adrenostazin (semicarbazona adrenocromului) este forma cea mai stabila a adrenocromului utilizat in terapeutica. Adrenocromul ca atare reprezinta unul din produsii de oxidare ai adrenalinei.

Actiune farmacoterapeutica:

Adrenostazin este un hemostatic de sinteza si un tonic capilar. Actiunea hemostatica se datoreste in primul rand unei vasoconstrictii capilare, precum si reducerii timpului de sangerare. Administrat la om normal, reduce timpul de sangerare de la 200 secunde la 120-110 secunde.

Normalizeaza timpul de sangerare prelungit in mod patologic. Adrenostazinul nu intervine in procesul de coagulare; diferite teste de coagulare (timpul de coagulare, timpul de protrombina etc.) au fost gasite nemodificate dupa administrarea adrenostazinului.

Adrenostazinul actioneaza asupra peretelui vascular avand actiune similara cu vitamina P, marind rezistenta acesteia si in acelasi timp diminua permeabilitatea capilara. Desi este un produs de oxidare a adrenalinei, adrenostazinul nu pastreaza nici una din proprietatile simpatico-mimetice ale acestuia, neprovocand modificari ale tensiunii arteriale, pulsului sau debitului cardiac.

Indicatii:

Prevenirea si tratamentul hemoragiilor chirurgicale:

- profilactic preparator in interventii chirurgicale care expun la hemoragii capilare ORL, urologie, chirurgie osoasa, toraco-pulmonara.
- tratamentul hemoragiilor declarate.

Prevenirea si tratamentul hemoragiilor medicale:

- purpura acuta si cronica; sindroame capilare toxice in intoxicatii arsenicale, benzolice; sindroame benzolice.
- hemoragii capilare ale aparatului respirator si digestiv;
- ciroze, hepatite, hematemeze.

Contraindicatii:

Nu se mentioneaza contraindicatii pentru tratamentul cu adrenostazin.

Mod de administrare:

Adrenostazinul se poate administra intramuscular si subcutanat. De asemenea in perfuzii intravenoase. Se recomanda 1-3 fiole de 1,5mg in 24 de ore in injectii intramusculare si subcutanate. Se administreaza in ajunul operatiei si cu o jumătate de ora inaintea interventiei. In caz de hemoragii intense se utilizeaza perfuzii a 50mg de adrenostazin in 500ml solutie izotonica.

Prezentare:

Cutii cu 5 fiole de 5ml cu 1,5mg.

Cutii cu 3 fiole de 10ml cu 50mg.

Producator:

TERAPIA S.A. Cluj-Napoca, str. Fabricii nr. 124

Rugam insotiti orice reclamatie cu numarul de serie inscris pe cutie sau pe eticheta.

Pentru eliminarea pericolului de infectii locale si a transmiterii hepatitei epidemice, se vor intrebuinta seringi si ace fierte timp de 30 minute, iar locul administrarii se va dezinfecta in prealabil cu alcool, eter sau tinctura de iod.