

Advantan
metilprednisolon aceponat
Crema, unguent, unguent gras

Compozitie

1 g Advantan contine 1 mg (0,1%) metilprednisolon aceponat.

Proprietati

Dupa aplicare locala, Advantan scade reactiile alergice si inflamatorii ale pielii, ca si reactiile asociate regenerarilor celulare accentuate, determinand disparitia simptomelor obiective (eritem, edem, ingrosarea si cornificarea suprafetei pielii) cat si a acuzelor subiective (mancarime, arsuri, durere).

Indicatii

Eczeme endogene (dermatita atopica, neurodermatita), eczema de contact, degenerativa, dishidrotica, vulgara si la copii.

Dozare si administrare

Cand nu este prescris altfel de catre medic, forma de Advantan indicata se va aplica o data pe zi in strat subtire in zonele afectate ale pielii.

In general, durata tratamentului nu trebuie sa depaseasca 12 saptamani la adulti si 4 saptamani la copii.

Advantan crema

Avand un continut ridicat de apa si scazut in grasimi.

Advantan crema este in special indicat in stadiile acute si uscate de eczema, in cazul unei pielii foarte grase si pentru zonele expuse sau cu par.

Advantan unguent

Afectiunile pielii care nu sunt nici foarte umede, nici foarte uscate, necesita o baza cu proportie echilibrata de apa si grasime. Advantan unguent face pielea discret grasa fara retentie de caldura sau lichid. Din cele trei tipuri de Advantan, acesta este cel mai larg folosit.

Advantan unguent gras

Cazurile cronice cu piele foarte uscata necesita o baza anhidrica grasa. Efectul ocluziv al bazei din unguentul gras promoveaza procesul de vindecare.

Efecte secundare

In cazuri izolate pot aparea local simptome ca: prurit, senzatie de arsura, eritem, vezicule. Atrofia pielii, teleangiectazii, striuri sau aparitia de acnee pot aparea in tratamentul cu corticoizi puternici, in timpul studiilor clinice, nici unul dintre aceste efecte secundare nu a aparut sub tratament cu Advantan pe perioade de sub 12 saptamani la adulti si sub 4 saptamani la copii.

Ca si la alti corticoizi cu utilizare locala, urmatoarele efecte secundare pot aparea in cazuri rare: foliculita, hipertricoza, dermatita periorala si reactii alergice la unul din ingredientele produsului.

Contraindicatii si riscuri

Infectiile specifice (tuberculoza sau sifilis), situate pe zonele care trebuie tratate, sau afectiuni virale (vaccina, zona zoster, varicela) sunt contraindicatii pentru terapia cu Advantan.

Indicatia clinica pentru tratamentul cu Advantan trebuie bine cantarita la pacientele gravide sau care alapteaza, luandu-se cu atentie in considerare riscurile si avantajele, in particular, aplicarea pe zone intinse ale pielii sau pe perioade lungi de timp trebuie evitata.

Note speciale

Terapia specifica aditionala este necesara in afectiunile pielii infectate cu bacterii si/sau fungi.

Daca pielea se usuca prea tare dupa tratamentul cu Advantan crema, pacientul trebuie sa schimbe produsul

cu o forma care contine mai multe grasimi (Advantan unguent sau Advantan unguent gras).

Nu a fost observata, nici la copii nici la adulti, o diminuare a functiei adrenocorticale in cazul aplicarii tratamentului pe zone largi ale pielii (40 pana la 60% din suprafata pielii). Oricum, durata de utilizare trebuie sa fie cat mai scurta posibil in aceste cazuri.

Nu va fi permis contactul Advantan cu ochii atunci cand este aplicat pe fata.

Daca exista dermatita periorala sau rozacee, Advantan nu se va aplica pe fata.

Brosura stiintifica contine informatii suplimentare pentru medici.

Prezentare

Tuburi de 5, 10, 15, 30, 50, 100 g.

A se pastra in conditii corespunzatoare si a nu se lasa la indemana copiilor.