

ALFLUTOP

Solutie injectabila, 10%

Compozitie

O fiola contine 0,1 ml concentrat bioactiv din peste marin marunt (substanta uscata: condroitin sulfat, aminoacizi, zaharuri totale, mioinozitol, saruri de Na, K, Ca, Mg, Cu, Fe, Mn, Zn, compusi din grupa glicerofosfolipidelor, care contin in structura de baza glicerina, fosfor, alaturi de azot sau sulf; fenol) si excipienti apa pentru preparate injectabile.

Grupa farmacoterapeutica: Alte medicamente pentru afectiuni ale sistemului musculo-scheletic. Diverse.

Indicatii terapeutice

- boli reumatice degenerative: coxartroze, gonartroze, spondiloze, artroze interfalangiene;
- convalescenta (ca adjuvant).

Contraindicatii

Hipersensibilitate la oricare dintre componentii medicamentului.

Precautii

Medicamentul poate determina aparitia de reactii anafilactice.

Interactiuni

Nu se cunosc.

Atentionari speciale

Medicamentul se va administra cu prudenta in boli autoimune (poliartrita reumatoida, spondilita anchilopoetica, lupus eritematos, sclerodermie), sub stricta supraveghere medicala.

Sarcina si alaptarea

Deoarece nu a fost stabilita siguranta administrarii la gravide si la mame care alapteaza se recomanda a se evita administrarea medicamentului la aceste paciente.

Capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje

ALFLUTOP- solutie injectabila nu influenteaza capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Doze si mod de administrare

Adulti

Administrarea se face prin injectare profund intramuscular a 1 ml solutie injectabila (o fiola *ALFLUTOP* - solutie injectabila) zilnic, timp de 3 saptamani. Ultimele teste clinice recomanda injectii intraarticulare in articulatiile afectate cate 1-2 ml (1-2 fiole *ALFLUTOP* - solutie injectabila) din 3 in 3 zile, 5 administrari sub stricta supraveghere medicala.

Cura se poate repeta dupa 3-6 luni, la indicatiile medicului.

Reactii adverse

Ocazional pot apare dureri in articulatiile injectate care, insa, nu necesita intreruperea tratamentului.

Supradozaj

In cazul supradozajului, la pacientii cu predispozitie, pot sa apara reactii alergice (uneori severe).

Pastrare

A nu se utiliza dupa data de expirare inscrisa pe ambalaj.

A se pastra la temperaturi intre 15-25°C, in ambalajul original.

A nu se lasa la indemana copiilor.

Ambalaj

Cutie cu 10 fiole din sticla bruna, cu inel de rupere, a cate 1 ml.

Producator

S.C. BIOTEHNOS S.A., Romania

Detinatorul Autorizatiei de punere pe piata

S.C. BIOTEHNOS S.A. Str. Dumbrava Rosie, nr.18, sector2, 020464 Bucuresti, Romania

Data ultimei verificari a prospectului

Noiembrie, 2005