

BENZOAT DE BENZIL

Crema, 25%

Compozitie

100 g crema contin benzoat de benzil 25 g si excipienti: propilenglicol, alcool cetilstearyl, parafina lichida, beta-hidroxibenzoat de metil, beta-hidroxibenzoat de n-propil, apa purificata, alcool etilic.

Indicatii terapeutice

Tratamentul scabiei, formele fara leziuni de suprainfectie sau eczematoase.

Contraindicatii

- Hipersensibilitate la benzoatul de benzil sau la oricare dintre excipientii produsului.
- Copiii cu varsta sub 2 ani.

Precautii

Produsul nu trebuie sa vina in contact direct cu mucoasele si ochii. Persoana care a aplicat crema trebuie sa se spele foarte bine pe maini. Administrarea se va face sub stricta supraveghere a medicului.

Interactiuni

Nu se cunosc.

Attentionari speciale

Benzoat de benzil nu trebuie aplicat pe mucoase.

Nu se recomanda administrarea Benzoat de benzil in cazuri in care la nivelul tegumentelor zonelor interesate exista rani deschise.

Copii

In cazul copiilor, mainile trebuie acoperite cu pansament pentru a se evita ingestia substantei.

Sarcina si alaptarea

In timpul sarcinii si alaptarii se recomanda aplicarea Benzoat de benzil pe suprafete de micaintindere, in cantitate nu prea mare si pe o durata limitata.

Capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje

Benzoat de benzil nu influenteaza capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Doze si mod de administrare

La adulti, *Benzoat de benzil* se aplica 2 zile la rand. Indepartarea cremei se face prin spalare cu apa si sapun la 24 de ore dupa prima administrare.

La copiii cu varsta peste 2 ani, femeile gravide sau care alapteaza, Benzoat de benzil se aplica o singura data si se indeparteaza prin spalare dupa 12 ore. In cazul copiilor, mainile trebuie acoperite cu pansament pentru a se evita ingestia substantei.

Pruritul, care poate sa persiste pana la 2 saptamani dupa aplicatii, nu justifica reluarea tratamentului.

In cazul leziunilor infectate sau eczematoase trebuie efectuat intai tratamentul afectiunilor supraadaugate.

In general, Benzoat de benzil se aplica seara pentru a ramane pe tegumente cat mai mult timp. Se spala corpul cu apa si sapun si se usuca cu un prosop moale.

Crema se aplica imediat pe intreaga suprafata a corpului, exceptand fata si scalpul. Produsul trebuie sa patrunda bine in pliurile tegumentului, in special la maini.

Este important ca tratamentul sa fie aplicat simultan pacientilor cu scabie din aceeasi colectivitate, iar dupa utilizarea Benzoat de benzil sa fie folosita lenjerie curata, deparazitata prin fierbere sau

autoclavare.

Reactii adverse

Benzoat de benzil poate determina reactii adverse locale, cum sunt arsuri locale si foarte rar eruptii cutanate.

In cazul aparitiei reactiilor adverse, tratamentul trebuie intrerupt si, imediat ce este posibil, zona pe care a fost aplicat Benzoat de benzil trebuie spalata cu sapun si apa calda.

Supradozaj

La copii exista riscul absorbtiei in circulatia sistemica a unor cantitati de benzoat de benzil care pot produce manifestari toxice.

In general, supradozajul se datoreaza ingestiei accidentale a produsului. In acest caz, apar semne de hiperexcitabilitate si convulsii, fiind necesara asistenta medicala de urgenta. Tratamentul consta in spalaturi gastrice si tratament de sustinere.

Pastrare

A nu se utiliza dupa data de expirare inscrisa pe ambalaj!

A se pastra la temperaturi sub 25C, in ambalajul original!

A nu se lasa la indemana copiilor!

Ambalaj

Cutie cu un tub din aluminiu a 35 g crema.

Producator

S.C. Mark Pharmaceuticals S.R.L.,
Romania

Detinatorul Autorizatiei de punere pe piata

S.C. Mark Pharmaceuticals S.R.L., Str. Moara de Foc, nr. 35, Iasi, Romania

Data ultimei verificari a prospectului

Iunie 2005