

Eskazole Comprimate, 400 mg

Vă rugăm să citiți cu atenție în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați medicamentul dumneavoastră.

Păstrați acest prospect. S-ar putea să aveți nevoie să-l recitiți.

Dacă aveți întrebări ulterioare sau nelămuriri vă rugăm să vă adresați medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Acest medicament v-a fost prescris doar dumneavoastră personal. Nu trebuie să-l dați altora deoarece s-ar putea să le facă rău, chiar dacă au aceleași simptome ca ale dumneavoastră.

Ce conține Eskazole?

Eskazole conține, ca substanță activă, albendazol. Un comprimat conține 400 mg albendazol și excipienți: lactoză, celuloză microcristalină, amidon de porumb, croscarmeloză sodică, povidonă, laurilsulfat de sodiu, Sunset Yeliow (E 110), zaharină sodică, stearat de magneziu, aromă de vanilie, aromă de fructul pasiunii, aromă de portocală. Un comprimat Eskazole conține 1,9 mg sodiu.

Cine produce Eskazole?

Eskazole este produs de către:

Glaxo Wellcome Productions

Zone industrielle du Terras, 53100 Mayenne, Franța

Deținătorul Autorizației de punere pe piață este:

GlaxoSmithKline Export Limited

980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Ma[^]*, „.«amc

Ce este Eskazole și pentru ce este utilizat?

Eskazole aparține unui grup de medicamente numite antihelmintice, care sunt eficiente împotriva unor anumiți viermi care pot parazita corpul uman. Eskazole este utilizat în tratamentul bolii hidatice, determinată de către un vierme care poate trăi în corpul uman. Formele inactive ale acestui vierme (larvele) formează chisturi în corp care se dezvoltă lent. Medicamentul dumneavoastră omoară larvele și prin aceasta oprește creșterea chisturilor.

Ce trebuie să știți înainte de a utiliza Eskazole?

Dacă răspunsul dumneavoastră la următoarele întrebări este DA, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru a ști ce trebuie să faceți:

- Sunteți sau credeți că sunteți gravidă?
- Doriți să rămâneți gravidă?
- Sunteți alergică la albendazol sau la oricare dintre excipienții medicamentului? Ați mai utilizat Eskazole înainte și după aceea v-ați simțit rău? Aveți intoleranță la unele categorii de zaharuri?
- Alăptați?
- Ați avut unele tulburări sanguine?
- Aveți greutate sub 60 kg?

Medicul dumneavoastră vă va recomanda efectuarea cu regularitate a unor teste hepatice și sanguine la începutul și în timpul efectuării tratamentului cu medicamentul dumneavoastră. Acest medicament nu trebuie administrat la copii.

Dacă sunteți femeie și vă aflați în perioada fertilă, trebuie să utilizați măsuri contraceptive adecvate în timp ce utilizați acest medicament. Trebuie să utilizați măsuri contraceptive

non-hormonale, de exemplu: prezervativ, diafragmă cu sau fără spermicid etc.

Puteți să utilizați Eskazole concomitent cu alte medicamente?

Trebuie să spuneți medicului dumneavoastră despre toate medicamentele pe care le utilizați, chiar și despre cele pe care le-ați putut obține fără prescripție medicală.

Trebuie să spuneți medicului dumneavoastră dacă utilizați medicamente pentru tratamentul epilepsiei (anticonvulsivante), mijloace contraceptive hormonale (contraceptive orale), medicamente pentru tratamentul diabetului (antidiabetice orale), medicamente care scad coagulabilitatea sângelui (anticoagulante), teofilină, cimetidină, praziquantel sau dexametazonă.

Cum trebuie să utilizați Eskazole?

Acest medicament se administrează pe cale orală.

Medicul dumneavoastră va stabili câte comprimate trebuie să utilizați și pentru cât timp.

Pentru pacienții cu greutate peste 60 kg, doza recomandată este de 400 mg albendazol (un comprimat Eskazole) de 2 ori pe zi timp de 28 zile.

Medicul dumneavoastră vă poate recomanda să repetați acest tratament după un interval de pauză de 14 zile, de obicei de până la 3 ori.

Eskazole trebuie administrat în timpul mesei. Comprimatele pot fi administrate în mai multe prize în decursul aceleiași zile, de exemplu un comprimat dimineața și celălalt seara.

Medicul dumneavoastră vă poate prescrie Eskazole înainte sau după o intervenție chirurgicală pentru îndepărtarea chistului hidatic. În unele cazuri medicul dumneavoastră vă poate recomanda să continuați utilizarea medicamentului în cicluri de tratament de 28 zile. Este important să respectați recomandările medicului dumneavoastră.

Ce trebuie să faceți dacă utilizați prea multe comprimate?

Trebuie să utilizați doar dozele recomandate de către medicul dumneavoastră. Dacă utilizați prea multe comprimate, adresați-vă imediat medicului dumneavoastră sau prezentați-vă la camera de gardă a celui mai apropiat spital. În acest caz trebuie să aveți la dumneavoastră medicamentul și să-l prezentați medicului care vă consultă.

Ce trebuie să faceți dacă uitați să luați o doză?

Dacă uitați să luați o doză, luați următoarea doză în timpul mesei următoare, apoi continuați administrarea conform recomandărilor medicului dumneavoastră.

Ce reacții adverse poate să aibă Eskazole?

Ca toate medicamentele Eskazole poate să determine, în unele cazuri, reacții adverse. Unii pacienți au prezentat durere abdominală, greață și vărsături, la unii pacienți au fost raportate, de asemenea, amețeli, febră și cefalee. Spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți durere în gât și febră. Ca în cazul altor medicamente similare, subțierea firelor de păr și pierderea moderată a părului au fost asociate cu utilizarea acestui medicament. În cazul utilizării medicamentului dumneavoastră pot să apară unele tulburări hepatice, de aceea medicul dumneavoastră vă va recomanda efectuarea unor teste sanguine pentru verificarea funcției hepatice în timpul tratamentului. Medicamentul dumneavoastră a determinat, de asemenea, scăderea numărului unor celule sanguine. Foarte rar, unii pacienți au observat apariția erupțiilor cutanate și a pruritului. Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă observați apariția oricărei reacții adverse, chiar dacă nu a fost menționată în acest prospect.

Cum trebuie păstrat Eskazole?

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.
A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Ambalaj

Cutie cu 12 blistere din PVC-PVDC/AI a câte un comprimat
Cutie cu 56 blistere din PVC-PVDC/AI a câte un comprimat
Cutie cu un flacon din PP a 60 comprimate

Data ultimei verificări a prospectului

Ianuarie 2006