

Helmintox
Pirantel
Tablete de 125 mg și 250 mg - Suspensie orală

INDICAȚII:

Acest medicament este un agent antiparazitar, activ asupra viermilor și este recomandat în tratamentul pentru oxiuri, ascarizi și anchilostome.

DOZAJ ȘI ADMINISTRARE:

A se folosi după prescripția medicului dumneavoastră.

Helmintox-ul nu se administrează pe stomacul gol sau după purgație și poate fi administrat într-o singură doză.

Oxiuroză și ascaridioza: dozajul recomandat:

	Copii	Adulți
SUSPENSIE	Pt. 10 kg = 1 linguriță standard;	- 6 lingurițe standard;
ORALA	Pt. 20 kg = 2 lingurițe standard;	- la adulții cu greutate peste
	Pt. 30 kg = 3 lingurițe standard;	75 kg, 8 lingurițe standard.
	Pt. 40 kg = 4 lingurițe standard;	
	Pt. 50 kg = 5 lingurițe standard;	
TABLETE	Pt. 10 kg = 1 tabletă;	- 6 tablete;
DE 125 mg	Pt. 20 kg = 2 tablete;	- la adulții cu greutate peste
	Pt. 30 kg = 3 tablete;	75 kg, 8 tablete.
	Pt. 40 kg = 4 tablete;	
	Pt. 50 kg = 5 tablete.	
TABLETE		- 3 tablete;
DE 250 mg		- la adulții cu greutatea peste
		75 kg, 4 tablete.

În oxiuroză este uneori necesar să se reînnoiască tratamentul după 3 săptămâni. Trebuie luate măsuri igienice pentru a evita reîmbolnăvirea (se insistă pe spălarea mâinilor la copii). Anchilostomioza: A se folosi după prescripția medicului dumneavoastră.

EFECTE ADVERSE:

CA TOATE PRODUSELE ACTIVE, ACEST MEDICAMENT POATE INDUCE LA ANUMITE PERSOANE EFECTE MAI MULT SAU MAI PUȚIN SUPĂRĂTOARE: ele sunt rare pot apare: dureri abdominale, grețuri, vărsături, diaree, datorate în cele mai multe cazuri eliminării viermilor rar; pot apare dureri de cap temporare, amețeli, oboseală.

PRECAUȚII DE FOLOSIRE: Pentru a evita posibilele interacțiuni cu alte medicamente, întotdeauna informați medicul sau farmacistul dumneavoastră de orice tratamente concomitente. Administrarea HELMINTOX-ului nu este recomandată atunci când pacientul suferă de boli hepatice. Femeile gravide trebuie să informeze medicul.

A NU SE TINE LA ÎNDEMÂNA COPIILOR! ACEST MEDICAMENT V-A FOST PRESCRIS DVS ÎNTR-O ANUMITĂ SITUAȚIE.

A NU SE FOLOSI ÎN ALTE CONDIȚII! A NU SE REÎNNOI TRATAMENTUL FĂRĂ RECOMANDAREA MEDICULUI.

HELMINTOX-ul trebuie ținut într-un loc uscat, răcoros și ferit de lumină.

PREZENTARE:

- Cutie cu 6 tablete de 125 mg de pirantel
- Cutie cu 3 tablete de 250 mg de pirantel
- Sticla de 15 ml
- suspensie orală, dozat cu 50 mg pirantel/ml
- Fiecare sticlă de 15 ml este egală cu 6 lingurițe standard de 2,5 ml, conținând fiecare 125 mg de pirantel.

LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL

7-9, avenue F.V. Raspail - 94110 Arcueil - France

Reprezentat în România prin

Beaufour Ipsen International